



Елена Толстикова

Еще раз о кошке.  
Upgraded

Второе издание

**Елена Толстикова**  
**Еще раз о кошке.**  
**Upgraded. Второе издание**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=40941507](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40941507)*  
*ISBN 9785449635624*

**Аннотация**

Эта книга написана с большой любовью к кошкам и к их владельцам. Она поможет Вам выбрать котенка, правильно ухаживать за ним, при необходимости оказать первую помощь, а также лучше понять своего питомца, воспитать, а для любителей соревнований – принять участие в выставках и получить призы.

# Содержание

Предисловие	5
Разведение	7
Течка	7
Кот-производитель	9
Составление пар	12
Беременность	15
Роды	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# **Еще раз о кошке. Upgraded**

## **Второе издание**

**Елена Толстикова**

© Елена Толстикова, 2019

ISBN 978-5-4496-3562-4


Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Предисловие

Эта книга посвящается кандидату биологических наук Андрею Альбертовичу, кандидату в мастера спорта по плаванию и стрельбе, любящему и любимому мужу и отцу.

Человеку, который пожертвовал своей жизнью для спасения жизни миллионов.

Вместе со своими коллегами из Академии наук РБ участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.





# Разведение

## Течка

Течкой называют процесс, происходящий у самок, когда в яичниках происходит созревание одной или более яйцеклеток, что приводит к их последующему выделению.

Одновременно яичниками выделяются и специальные гормоны (эстрогены). Этот процесс вызывает изменения в поведении самок: меняется запах, настроение, поведение.

Для самцов это служит сигналом к действию. Самка подпускает к себе самца только во время течки.

В этот период самки начинают издавать характерные громкие звуки, катаются по земле или по полу, принимают позу «таксы» т.е. седлообразно выгибают позвоночник и перебирают задними лапами.

Обычно течка у кошек протекает в марте, в июне, а затем в сентябре.

В среднем течка длится 3—6 дней, но может быть продолжительнее, если кошка долго не покрывалась.





# **Кот-производитель**

## **Если кот предназначается для разведения породы, его следует содержать в хороших условиях, он должен быть под постоянным наблюдением врача**

Самцы готовы к вязке на протяжении всего года. Но именно весной, а у некоторых в июне и в сентябре, обостряется возбудимость.

В период обострения коты-производители способны щедро метить все вокруг, опрыскивая стены и предметы мочой с резким, едким запахом. При этом, у кота легко подрагивает хвост.

Железы, выделяющие специфический запах, находятся также на щеках и по бокам. В это время коты могут запрыгивать на кошек, даже на тех, у которых нет течки, особенно на молодых. До вязки дело не доходит, так как кошка не занимает необходимой позиции.

### **Внимание!**

Если у Вас живет короткошерстная кошка, а Вы на вязку или по какой-то другой причине возьмете в дом длинно-

шерстного кота или кошку, то Ваш питомец может оказаться в паническом страхе, который может еще долго длиться.

Пушистость гостя воспринимается им как постоянная угроза, как сигнал «осторожно – я опасен!»

Даже самый *непушистый* персидский кот может привести в состоянии длительной нервозности своего гладкошерстного собрата.



# Составление пар

Кошка, которая растет на свободе, легко находит себе партнера.

Если же кошка не выходит из дома, а ее хозяин мечтает повязать ее с определенным самцом и обзавестись потомством, то хозяин должен (лучше всего на третий день течки) отвезти ее к партнеру.

Можно сделать и наоборот, но все зависит от того, как пройдет первая встреча.

Кот может испугаться новой обстановки и не приблизиться к кошке. Кошка также может почувствовать себя в опасности и не подпустить близко кота, даже попытается напасть.

Если кошка никогда прежде не была повязана, то случается, что, несмотря на полный разгар течки, она так защищается от приближающегося самца, так отчаянно от него отбивается, что тот, в конце концов, несмотря на ее призывы больше уже не приближается к ней.

Чтобы такое не случилось, хозяин должен помочь ей успокоиться. Мягко придерживать обеими руками кошку за голову, не давая ей повернуться назад, поглаживать ее, тем временем подзывая по кличке кота. Таким образом, снимается агрессивный настрой обоих.

Голову кошки следует придерживать даже тогда, когда кот схватит кошка за загривок, а убирать руку в момент, когда

кошка издаст характерный громкий крик.

Если же кошка уже знает, что означает встреча с котом в период течки, то она позволит подбежать, схватить себя за кожу на затылке и произвести вязку.

Весь процесс вязки, включая вступительную часть со «счесыванием», когда самец задними лапами делает движения, как будто счесывает что-то с затылка самки, длится несколько минут.

В кульминационном моменте кошка издает громкий крик, после чего впадает в состояние ярости.

После этого крика партнер тут же отскакивает, она же еще несколько секунд качается по полу.

В этот момент не следует приближаться к кошке, она может серьезно поцарапать.

После нескольких вязок, течка у кошки заканчивается. Длительность течки от 3 до 6 дней.



# Беременность

Овуляция, или высвобождение яйцеклеток из пузырьков Граафа, происходит через 30—40 часов после вязки.

Как происходит оплодотворение: сперматозоид проникает в яйцеклетку, происходит объединение ядер.

Каждая клетка хранит в себе генетический материал.

При объединении клеток появляется новая клетка, которая начинает процесс интенсивного деления до стадии, называемой бластоциста. Этот период длится 5—7 дней.

Зародыши попадают сначала в своеобразное расширение яйцеводов перед тем, как попадают в матку.

В этом месте зародыши разделяются, и стенки их обрастают околоплодной пленкой.

Так начинается период беременности, который у кошек длится в среднем 63 дня.

Нормой является период от 57 до 70 дней. Отсчет ведется от момента первой вязки.

В начальной фазе беременность трудно распознать.

Первым признаком может служить быстрое окончание течки и отсутствие следующей через несколько недель.

Еще одним признаком наступившей беременности является порозовение сосков, увеличение их в размере.

И только через месяц заметно увеличивается живот (в зависимости от количества приплода).

На четвертой недели беременности врач может, при осторожном ощупывании, определить количество сначала округлых, а затем удлиняющихся комочков, каждый из которых представляет собой плод в оболочке, наполненный околоплодной жидкостью.

Во второй половине протекания беременности, то есть с третьей недели, можно ладонью определить шевеление плода.

Со временем оно становится все более ощутимым и видимым.

На седьмой недели уже можно отчетливо различить плод с помощью ультразвука, поскольку у котят уже сформировался скелет.

В период беременности кошка становится еще более нежной и ищет контакта с человеком.

Встречая нежность и ласку, она становится увереннее и спокойнее.

За неделю или две до даты предполагаемых родов, следует начать подготовку ее «материнского домика».

По мере возможности, это должна быть корзина или коробка с небольшой крышкой.

Размеры домика 40—50 см и до 30 см высотой. Он должен находиться на одном месте, отогните один край коробки, чтобы кошка без особого труда запрыгивала в домик. На дно можно положить разного размера тряпочки, накрыв их мягкой и чистой тканью.



Материнский домик должен стоять в теплом и спокойном месте, но недалеко от людей, к которым кошка успела привыкаться.

После предоставления кошке нового места, посмотрите как она на него будет реагировать.

Если оно будет воспринято ею нормально, то она покажет это, часто прыгая туда и проводя там часть времени еще до родов.

Но случается, что в момент родов кошка не идет в подготовленное место, а старается быть рядом с хозяином или же забирается в шкаф.

В период беременности кошке следует обеспечить особенно хорошее питание, добавить в рацион незаменимые кислоты, витаминно-минеральный комплекс для беременных кошек.

Пища должна быть богата белками животного происхождения, клетчаткой.

В этот период кошку следует оберегать от физических и психических стрессов, так как это может привести к выкидышу.

Иногда за два дня до родов хозяин перестает нащупывать движение плода у кошки.

Очень часто перед родами кошка начинает ходить за хозяином по пятам.





# Роды

Живущая на свободе кошка заранее готовит тихий уголок, где она сможет родить и спрятать котят от чужаков. Например: на чердаке, в подвале, в хозяйственных постройках в деревне, просто в ямке под ветками кустов.

Человеку бывает трудно найти этот домик, а через несколько недель, когда из него выходят котята, уже поздно что-то исправить.

Поэтому надо стараться устроить кошке домик в зоне наблюдения человека, предоставить покой и тишину, а позже позаботиться о котятках.

У кошки, живущей в доме, более доверчивой к людям, легко проследить все стадии родов.

Приближение родов связано у кошки с потерей аппетита. Она становится беспокойной, поминутно входит и выходит из своего материнского домика, перекапывает в нем подстилку, пытаясь углубить ее.

Часто посещает свой туалет безрезультатно. Из половых органов кошки начинает выделяться водянистая слизь как результат выделения слизистой пробки, закрывавшей вход в матку.

Именно с этого момента хозяин должен постоянно находиться рядом, успокаивать кошку поглаживанием и ласковым голосом.

Животное выразит свое удовольствие легким урчанием и будет с удовольствием подставлять тело при поглаживании.

Уже первые легкие схватки приводят к лопанию околоплодного пузыря и отхождению вод.

Если воды не отойдут, то котёнок появляется на свет в заполненном жидкостью пузыре.

Обычно после отхода вод через 15—20 минут начинаются сильные схватки, при которых происходит сильное сокращение мускулатуры живота. Они могут быть очень болезненными, кошка начинает кричать.

Иногда рождение одного котенка происходит после каждой схватки, но случается, проходит несколько сокращений и только тогда рождается котенок, завернутый в кроваво-розовый послед.

При физиологически правильных родах котят появляются вперед головой (у персидской породы голова котят довольно широкая, что затрудняет роды) или ягодицами.



Если же плод при прохождении родовых путей занимает поперечное положение, то, несмотря на сильные схватки, кошка не сможет родить без посторонней помощи.

Если у кошки от усталости сокращение мускулатуры становится все слабее и она уже не в состоянии вытолкнуть очередной плод, хозяин может стимулировать схватки поглаживанием спины и боков.

Если родовые пути сухие, что тоже значительно затрудняет нормальное протекание родов, их можно смазать парафиновым маслом. Однако непрофессиональная помощь может только осложнить роды.

Может случиться, что при выходе котенка ягодицами вперед, в тот момент, когда котенок вышел только наполовину, пуповина передавливается.

Прекращается доступ крови, насыщенной кислородом. Котенок пытается сделать вдох, но голова еще находится в матери.

Вместо воздуха он заглатывает порцию околоплодных вод, что приводит к тому, что он задыхается.

Можно оказывать помощь при родах, вытягивая очень осторожно котенка за загривок, за кожу по бокам (тремя пальцами), но ни в коем случае не за позвоночник.

Во время родов кошка обычно лежит на боку с поджатой задней ногой.

В перерывах между схватками она тщательно вылизывает область гениталий.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.