

ПУДЕЛЬ.



**ЛЕЧИМ СОБАКУ
САМИ**

Илья Валерьевич Мельников
Пудель. Лечим собаку сами
Серия «Пудель»

Текст предоставлен автором
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3265375

Аннотация

Книга рассказывает о самой популярной комнатной породе собак – пуделе. Пуделя часто определяют как "интеллигента" среди собак, и ему, похоже, это нравится. Еще мы ценим пуделя за приветливость, игривость, готовность развлечь нас. Эти качества он сохраняет до глубокой старости. Читатель научится лечить своего четвероного компаньона.

Содержание

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ	4
ПРИЕМЫ ФИКСАЦИИ СОБАК	10
НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДОРОВОЙ СОБАКИ	11
КАК ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА СОБАКИ	12
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧАСТОТУ ПУЛЬСА	13
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Илья Мельников

Пудель. Лечим собаку сами

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

Если собаку сшибло автомобилем, у нее может быть внутреннее кровоизлияние, вывих или перелом кости, сотрясение мозга или повреждение нерва. Чтобы не ухудшить положение, с раненной собакой надо обращаться с чрезвычайной осторожностью. Кроме того, следует учитывать и другую опасность: даже самое добродушное животное в состоянии потрясения может проявить злобность и укусить человека, не исключая и любимого хозяина.

При серьезном ранении необходима ветеринарная помощь. Но часто надо принять немедленные меры, чтобы спасти собаку от еще больших повреждений.

Сильное кровотечение.

Если кровь сочится из раны, значит повреждена вена. Обычно это не бывает опасным. Если же кровь льется обильно и толчками, это означает, что поражена артерия. Большая потеря крови может представлять серьезную опасность.

Если кровотечение (венозное или артериальное) не очень

сильное, его можно остановить туго забинтовав рану. Для этого надо сначала наложить на нее кусок гигроскопической ваты или сложенной в несколько слоев ткани и потом обмотать бинтом.

В случае сильного артериального кровотечения чаще всего применяют жгут. Однако его нельзя сильно затягивать и через каждые 20 минут нужно совсем распускать, иначе может начаться гангрена. Жгут применяется лишь как временная мера, чтобы остановить кровь, пока она не свернется. Его накладывают, разумеется, выше или ниже раны по направлению к сердцу (ближе к сердцу).

Укусы и порезы.

Укусы, порезы и ссадины – обычные вещи у собак. Не обращайте внимания на мелкие царапины, которые собака зализывает. Укусы и крупные порезы нужно промыть мыльной водой, обработать йодом или другим антисептиком и забинтовать.

Бывает, что собака, поранив ногу или другую часть тела, постоянно лижет или чешет рану, не давая ей зажить. Наложившую повязку она тут же сдирает. Если рана на голове, то можно надеть собаке так называемый "елизаветинский воротник" и держать его два дня, пока не заживет.

Шок.

Это состояние связано с нарушением кровообращения. Оно может быть результатом потери крови, повреждения тканей, удара в жизненно важный центр или даже эмоцио-

нального потрясения. Степень тяжести бывает разной: от состояния, напоминающего сон, до глубокого обморока, который может окончиться смертью.

В зависимости от причины и степени тяжести шока, проявления его тоже бывают разными. Обычно это частое, поверхностное дыхание и учащенный пульс.

Жертву шока следует накрыть чем-нибудь теплым. Можно использовать также грелку. Чтобы вывести собаку из состояния шока, ветеринары часто делают внутривенное вливание глюкозы, разведенной в нормальном солевом растворе. Этот раствор представляет собой просто дистиллированную воду, содержащую такой же процент соли, как и кровь.

Ожоги.

Если ожог не очень сильный, то нужно, срезав с обожженного участка шерсть, смазать больное место стерильным вазелином, специальной мазью, которую продают в аптеках, оливковым или минеральным маслом. Широко применяют также однопроцентный раствор пикриновой кислоты, свежеприготовленный 2,5-5% раствор танниновой кислоты или насыщенный раствор двууглекислой соды.

Пчелиные и осиные укусы.

Собака имеет привычку тьякать на пчел и ос, что не всегда обходится без последствий. Чтобы облегчить боль от укуса пчелы или осы, надо сначала вытащить жало, а потом сделать примочку из слабого раствора нашатыря или смоченной в воде питьевой соды.

Укус змеи.

Укус ядовитой змеи сразу же вызывает сильную боль и опухоль вокруг укуса и требует быстрых действий. Если нет возможности оказать собаке немедленную профессиональную помощь, вы должны сделать максимум того, что в ваших силах.

Две вещи необходимо сделать в первую очередь: выдавить как можно больше яда из раны и не дать оставшемуся яду распространиться по телу. Кончиком ножа или бритвы, которые желательно обжечь спичкой, сделайте надрезы в форме буквы "X" над каждым следом зуба. Глубина надреза должна быть 4-6 мм. Следует помнить, что зубы змеи прокусывают ткань под углом, поэтому лучше всего сделать так, чтобы верхний и нижний крест соединились. Выдавите кровь, а если есть под рукой какой-нибудь отсасывающий аппарат, используйте его для вытягивания крови из раны. Закапайте в рану раствор марганцовки. Наложите жгут.

Обморожение.

Если жертву обмороживания нельзя немедленно перенести в теплое помещение, согрейте обмороженное место, приложив руку, а потом накройте куском одеяла, шарфом и т.п. Это восстановит кровообращение.

Обмороженные участки следует согревать постепенно. Не трите эти места, особенно снегом или льдом. Поврежденная морозом ткань легко рвется и ранение ее может привести к гангрене.

"Морская болезнь".

Собаки часто страдают "морской болезнью", особенно собаки с нервной конституцией. Их укачивает в машине до рвоты. Поэтому собаку следует кормить и поить не позже, чем за час до поездки и дать ей возможность облегчить желудок и мочевой пузырь.

Удаление посторонних предметов из глотки.

Чтобы вытащить у собаки из глотки застрявшую там кость или другой посторонний предмет, сожмите большим и указательным пальцами одной руки щеки собаки, чтобы заставить ее открыть шире пасть. Пальцами другой руки попытайтесь вытащить этот предмет. Если он застрял глубоко и пальцы до него не достают, возьмите пинцет или пассатижи с длинными концами.

Вспученный живот.

Иногда собаки объедаются продуктами, которые образуют в желудке так много газа, что он не успевает выходить. Желудок раздувается и если не принять мер, то очень сильное вздутие может привести к смерти.

Если нет возможности быстро оказать ветеринарную помощь, попытайтесь сначала выпустить часть газа, осторожно пропустив резиновую трубку в желудок собаки через пищевод. Если это не поможет, придется прибегнуть к более радикальному методу: сделать пункцию желудка снаружи.

Ветеринары прокалывают желудок специальным инструментом – трокаром. Это заостренный металлический стер-

жень в трубке, которая называется каннюла. Трокаром прокалывают желудок собаки с правой стороны, сразу же, где кончаются ребра. После этого трокар вынимают, а каннюла остается. Газ выходит через эту трубку и живот опадает.

Если у вас нет трокара, возьмите кусок металлической трубки и заострите ее с одного конца, чтобы легче было проколоть желудок. В крайнем случае воспользуйтесь острым концом длинного ножа. Это лучше, чем дать собаке умереть. Если трубка забьется остатками переработанной пищи, прочистите ее куском проволоки.

ПРИЕМЫ ФИКСАЦИИ СОБАК

Фиксация собаки – укрепление ее тела или отдельных частей в определенном положении для обеспечения безопасности человека при обследовании и оказании ветеринарной помощи, а также при уходе за ними. В некоторых случаях особо возбудимую собаку лучше не фиксировать, а просто, нежно поглаживая и разговаривая с ней, сделать нужную процедуру или инъекцию. Для фиксации челюстей собаки на ее голову надо надеть намордник. В экстремальных случаях – самодельный намордник, который можно сделать из бинта, шелковых чулок, галстука, из любых подручных средств.

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДОРОВОЙ СОБАКИ

Температура тела – 38, 5 – 39.

Пuls у взрослой собаки 70-120 ударов в минуту, у щенков до 150.

Частота сердцебиений в норме от 60 до 160 ударов в минуту.

Слизистые оболочки бледно-розовые (надо оттянуть нижнее веко или приподнять верхнюю губу собаки).

Частота дыханий 10-30 дыхательных движений. Определяют по колебаниям руки, положив ее на грудь животному.

У собаки хорошее настроение и аппетит.

КАК ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА СОБАКИ

Для измерения температуры тела собаки можно использовать как ветеринарный, так и медицинский термометр. Перед измерением температуры термометр проверяется на целостность, особенно его нижняя часть, где находится ртуть. Резервуар с ртутью смазывается вазелином или кремом. Хвост собаки слегка приподнимают и термометр вводят в анальное отверстие на 3-4 минуты. Почти все собаки к этой процедуре относятся беспокойно, поэтому, прежде чем приступить к измерению температуры, собаку необходимо зафиксировать, одеть на нее намордник и ошейник. После извлечения термометра его вытирают ватой, определяют температуру, обмывают теплой водой с мылом. Можно протереть и спиртом.

Повышенной температурой у собаки считается температура выше 39°C . Однако многие заболевания могут протекать без изменения температуры тела, поэтому решить вопрос об истинном состоянии животного может только ветврач.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧАСТОТУ ПУЛЬСА

Кроме измерения температуры и подсчета частоты дыхания, для определения состояния собаки следует произвести также подсчет сердечных толчков и пульса. Сердечный толчок легко ощутить, приложив ладонь к грудной клетке собаки слева, немного ниже лопатки. У собак мелких пород сердечный толчок можно прощупать и с правой стороны груди.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.