


Вильям А. Инглинг



Экстренная
гомеопатическая
помощь
в акушерстве

Ресурс
Москва 2011

Вильям А. Инглинг

Экстренная гомеопатическая помощь в акушерстве

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31760945
Инглинг, Вильям А. Экстренная гомеопатическая помощь в
акушерстве : Ресурс; Москва; 2011
ISBN 978-5-905392-04-7*

Аннотация

Автор книги «Экстренная гомеопатическая помощь в акушерстве», американский врач-гомеопат Вильям Инглинг, придерживался принципов естественного рождения и всегда старался свести к минимуму инструментальные и медикаментозные вмешательства в роды. Точно так же современными домашними акушерками движет философия невмешательства в естественные процессы беременности и родов. Акушерки часто предотвращают экстренные ситуации, используя мягкие, естественные методы коррекции проблем, такие как массаж, ароматерапия, остеопатия и гомеопатия.

Эта книга призвана стать карманным справочником по гомеопатии для домашних акушерок, врачей-акушеров, доул и помощниц в родах. Предполагается, что специалист, использующий данный справочник, уже хорошо знаком с

основными принципами и законами гомеопатического метода лечения.

Содержание

Предисловие	7
Введение	10
Часть I. Гомеопатические средства и показания к их применению	27
Aceticum acidum	27
Acontium	28
Aletris farinosa	30
Amyl nitrite	31
Antimonium crudum	32
Antimonium tartaricum	33
Apis mellifica	34
Apocynum cannabinum	36
Argentum nitricum	37
Arnica montana	39
Arsenicum album	42
Asarum europaeum	44
Atropinum	45
Aurum metallicum	46
Belladonna	47
Borax	51
Bryonia alba	52
Cactus grandiflorus	54
Calcarea carbonica	55

Camphora	57
Cannabis sativa	59
Cantharis	60
Carbo vegetabilis	62
Caulophillum	64
Causticum	67
Chamomilla	69
China officinalis	73
Chinum sulforum	76
Chloroformum	78
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Вильям А. Инглинг
Экстренная
гомеопатическая
ПОМОЩЬ В АКУШЕРСТВЕ

The Accoucheur's Emergency Manual

W.A. Yingling, M.D., Ph. D.

Member of the International Hahnemannian Association

© Издательство «Ресурс», 2011, перевод, оформление

*** * ***

Предисловие

Необходимость – не просто мать всех изобретений, но и движущая сила, побуждающая к написанию таких монографий, как эта маленькая книжечка. Разве можно не жалеть всем сердцем женщину в родовых муках? Разве кто-нибудь откажется *трудиться* ради облегчения ее страданий, если он чувствует в себе такую способность? Вот что двигало пером автора. Сострадание не требует объяснений.

Рукопись этой книги помогала мне облегчать страдания женщин и ускорять естественные роды, которые иначе неизбежно превратились бы в инструментальные. Мне известно из опыта, что показанное гомеопатическое лекарство – лучший друг роженицы, способный восстановить гармоничное взаимодействие всех частей организма и делающий роды настолько безболезненными, насколько это позволяют обстоятельства и форма родовых путей. И вот, мое сочувствие тем, кто приносит в этот мир новую жизнь и новые бессмертные души, побудило меня предложить свою помощь коллегам.

Надеюсь, данное руководство выведет акушера на показанное лекарство напрямую, без колебаний и потери времени. В этом поможет реперторий. Многие из нас переживали чувство неуверенности у постели роженицы, и были вынуждены делать назначения наугад или, теряя драгоценное время, возвращаться в офис, чтобы перелистать справочники,

или же прибегать к наихудшей практике применения «обычных» и народных средств. Настоящая книга исправит это положение, даст гомеопату возможность облегчать страдания и принесет славу великому делу Гомеопатии. Если врач положится на эти лекарства, тщательно подбирая их *у постели* пациентки, он обретет уверенность в них и в себе самом, потому что ни в одной сфере наши лекарства не действуют столь быстро и эффективно, как в момент чудесного превращения настоящей *боли* в изгоняющую силу родовых схваток без излишних страданий.

Несмотря на то, что гомеопатическое лекарство само по себе может исправить любое отклонение от нормального хода родов, оно не способно ни расширить костные структуры, ни устранить пороки их развития, врожденные или приобретенные в результате определенного образа жизни; оно также не может мгновенно прекратить влияние на роды различных местных злокачественных образований, рака и т. д. Это следует из здравого смысла. Однако случаев, не попадающих в сферу действия гомеопатических лекарств, сравнительно не много. У нас есть универсальный закон, и ни в какой ситуации гомеопат не получит таких хороших и скорых результатов, как в родах. Это и послужило поводом к написанию настоящего руководства. Отнеситесь снисходительно к общим и частным несовершенствам этой книги, и ищите в ней то, что принесет облегчение пациенткам, которые ждут вашей помощи и доверяют вам.

В.А. Инглинг

Введение

Настоящее руководство ставит своей целью помочь врачу в оказании экстренной помощи при неотложных состояниях и избавить его от необходимости иметь при себе один, а то и несколько толстых справочников или мчаться за помощью в офис. Предполагается, что читатель хорошо знаком с различными предлежаниями, патологиями органов, умеет пользоваться медицинским инструментарием, владеет разными приемами поворота и т. д.

В этой работе говорится исключительно о лекарствах и их использовании при неотложных акушерских состояниях, возникающих непосредственно до, после или во время родов или выкидыша. Мы не касаемся ситуаций, когда у врача есть достаточно времени, чтобы во всем разобраться, как это бывает при многочисленных заболеваниях, возникающих в процессе беременности, или проявившихся много дней спустя после родов. Это руководство только по неотложной помощи, хотя в нем содержатся все симптомы, сопутствующие конкретно описываемому состоянию, и множество указаний к использованию средств, обычно в острых состояниях не применяемых – поскольку невозможно заранее предугадать, какой симптом в критическую минуту может быть ключевым для спасения жизни или предотвращения чрезмерных страданий. Строго говоря, как неотложное может быть опре-

делено только состояние непосредственно угрожающее жизни, но поскольку любое чрезмерное страдание или патология может нести в себе явную или косвенную угрозу жизни, данное руководство может также включать в себя – и включает – указания по купированию подобных состояний. Насколько возможно, в руководство включены указания по использованию лекарств при родах и выкидышах, осложненных кровотечением, эклампсией.

Поскольку мы стремились упомянуть *все* симптомы, которыми можно было бы охарактеризовать данное неотложное состояние или представить достоверную картину лекарства, мы включили некоторые симптомы, которые могут показаться излишними. Но мы полагаем, что из соображений безопасности лучше включить в описание несколько редко или почти никогда не встречающихся симптомов, чем упустить что-либо, способное спасти жизнь или избавить от страданий. Кроме того, используя гомеопатию в каждом конкретном случае, невозможно предугадать какой именно симптом послужит указанием или окажется точным подобием, и какое именно лекарство будет в итоге названо. Любое лекарство из Материи медики может подойти в любом конкретном случае. Необходимо оказать помощь данному пациенту, и один симптом может указать на подходящее лекарство. Правило, которого следует придерживаться как в акушерской, так и в любой другой медицинской практике: *назначай лекарство, патогенез которого максимально покрыва-*

ет всю совокупность симптомов, наблюдаемых у данного пациента, даже если это лекарство никогда не использовалось и не рассматривалось в подобном случае или состоянии. При таком методе некоторые лекарства все же могут быть невольно упущены, но, как мы надеемся, с незначительной вероятностью.

Организовано данное руководство довольно просто. Первая часть содержит терапевтические указания по применению лекарств под различными рубриками. Хотя рубрики и отличаются по своим основным характеристикам, особенности каждого лекарства должны учитываться при рассмотрении целостной картины. Многократное упоминание определенного симптома под разными рубриками призвано привлечь внимание читателя к проходящим красной нитью отличительным чертам, которые, обычно встречаются среди свойств того или иного лекарства. В рубрике «Общее» мы пытались дать обзорное, как бы с высоты птичьего полета, описание каждого лекарства, и таким образом помочь читателю принять окончательное решение в сомнительных случаях. Для каждого лекарства приводится полная картина, что, если правильно сфокусировать взгляд, сможет ощутимо помочь в подборе истинного подобия.

Хотя рубрика «Выкидыши» достаточно полна, тем не менее, хорошо было бы справиться также с указаниями по симптомам в рубриках «Роды», «Кровотечения», «Задержка последа». Для всех симптомов, кроме характера кровоте-

ния, можно обращаться и к указаниям из других рубрик. То же относится и к конвульсиям. Таким образом, рубрики взаимозаменяемы для каждого отдельного случая. Все симптомы относятся к природе самого пациента, требующей того или иного лекарства, а не к *названию* болезни. Таким образом, общий симптом может встречаться при любом заболевании или состоянии.

Мы поместили симптом «матка в форме песочных часов» в рубрике «Роды», хотя он встречается и при задержке последа, и во многих других случаях.

В рубрике «Кровотечения» мы поместили несколько симптомов, характерных для менструальных кровотечений, поскольку они могут оказаться полезными и при подборе средств для послеродовых кровотечений.

Реперторий полон настолько, насколько это необходимо. При необходимости приводятся перекрестные ссылки, подходящие для данного случая. Их тщательное изучение сильно облегчит поиск нужного лекарства в экстренных ситуациях. Орудие нужно уметь применять. Нельзя полагаться на того, кто лихорадочно пытается ознакомиться с описаниями лекарств непосредственно в момент крайней необходимости, не говоря уже о множестве ошибок, неизбежных при таком подходе. Заранее зная как помочь, вы экономите половину времени, а время дорого в час родов. Для освоения репертория имеет смысл взять имеющийся случайный набор различных симптомов, и отыскать их в репертории, отмечая

при этом, какие именно присущие им особенности и характерные черты учитывались автором при их размещении. Для облегчения дальнейшей работы можно добавить ссылки. Такая методика может оказаться полезной тем, кто не привык работать с реперториумом.

В рубрике «Ребенок» приводится всего несколько симптомов. Но мы выделили их в отдельный реперторий для удобства тех, кто будет пользоваться данным руководством.

У нас тут нет места для длинных диссертаций, посвященных подбору гомеопатических средств, однако несколько слов мы все же вынуждены сказать. По крайней мере, хотелось бы заострить внимание на некоторых моментах и, по мере возможности, вселить уверенность в тех, кто все еще сомневается в действенности своей практики.

Можно ли с помощью гомеопатии обеспечить благополучие естественных родов? На наш взгляд, это *единственный* способ превратить патологические роды в нормальные, насколько позволяет состояние пациентки и обстоятельства. Хотя гомеопатия не способна изменить костные структуры, она может вернуть мягкие ткани к нормальному состоянию, если этому не препятствует местная патология типа раковой опухоли или рубцовой ткани, и даже тогда физические страдания можно свести к минимуму. Облегчая боль и одновременно поддерживая необходимую динамику маточных сокращений, гомеопатия, как никакой другой метод, позволяет роженице благополучно перенести это испытание. За

состоянием отдельных органов и общим состоянием пациентки стоят ее нервная система, жизненная сила и первопричина, разрушившая изначальный естественный порядок вещей, которые отчетливо поддаются воздействию гомеопатического лекарства. Наблюдать быстрое действие правильно подобранного лекарства в акушерской практике – чудесное, совершенно волшебное переживание.

Там где мудрый врач наблюдает за пациенткой все месяцы беременности, возможно благополучное, без особых страданий течение родов. Гомеопатия – лучший друг женщины. Это единственный способ дать женщине возможность родить легко, быстро и без излишних страданий. И это единственный способ гарантировать нормальное течение родов, и всего, что с ними связано. Разумеется, речь идет не о тех случаях, где строение костных структур изначально не благоприятствует родам, или мягкие ткани потеряли естественную растяжимость из-за местных патологических процессов. Но даже тогда можно что-то взять под контроль при своевременно начатом лечении по принципу «один стежок, но вовремя, стоит девяти». Благодаря гомеопатии, многие роды из-за имеющихся физиологических нарушений, чреватых опасностью для жизни или жесточайшими страданиями, могут пройти легко и благополучно. Все, что требуется от лечащего врача, это наличие знаний и уверенность в своих силах. Люди жаждут, чтобы ими руководили. В людях заложено больше веры в могущество гомеопатии, чем многим хо-

телось бы. Они ревностно следуют советам аллопатов в надежде получить облегчение. Они *могли бы* столь же ревностно следовать советам гомеопата, если бы он излучал уверенность в своей медицинской системе и настаивал на выполнении своих указаний. Прибавьте сюда положительное влияние большого числа благополучных исходов, причем благополучных настолько, что хвалебные отзывы начинают передаваться из уст в уста, от женщины к женщине одновременно с известием о счастливом разрешении от бремени. И таким образом обеспечивается быстрое распространение веры в абсолютное могущество гомеопатии. И пусть вас не смущает мой энтузиазм, я не раз видел все это собственными глазами. Поступайте так, и результат не заставит себя ждать. Главное, чтобы врач сам верил в гомеопатию, а уж гомеопатия его никогда не подведет в трудный час.

Как же правильно подобрать лекарство? Единственный совет – следовать указаниям Самуила Ганемана, изложенным им в «Органоне» и «Хронических болезнях». Отбросьте все аллопатические привычки и заблуждения, и полностью положитесь на гомеопатические лекарства. Жизнь и смерть поверяются провозглашенными вами принципами. Женское бесплодие, инвалидность, мании – все это прямые следствия акушерского вмешательства, выполненного в духе аллопатии, и одно это должно удерживать последователей Ганемана от аллопатических методов лечения. Глупо идти за поводырями, которые сами слепы, за этими морями, плы-

вущими наугад, без карты и компаса, по великому морю медицины, просто мечась на своем пути от одной пустой идеи к другой, в надежде отыскать панацею, исходя в своих поисках из одного лишь названия болезни или состояния.

Гомеопату нечасто приходится пользоваться щипцами и прочими акушерскими инструментами, однако он всегда должен быть готов применить их в случае действительной необходимости. Я всегда рекомендую сперва дать соответствующее лекарство, и лишь потом, если нет эффекта, воспользоваться инструментом – как последней возможностью. И тогда окажется, что инструменты требуются нам очень редко. У меня нет никаких возражений против инструментов, в случае если применение их действительно необходимо, но я против их рутинного неоправданного использования, когда это только травмирует мать и ребенка.

Предлагаемый здесь подход позволит также избежать в большинстве случаев разрывов промежности. Женщины совершенно не должны рваться в клочья. Может это и по-научному, но как-то не рационально и не подходит для нас, гомеопатов. Создатель сотворил мягкие женские ткани не для того, чтобы гинекологи демонстрировали на них свое мастерство. Это просто результат невежества и головотяпства акушера. «Женская промежность прекрасно приспособлена к выполнению своей задачи... Мое заключение: травмы промежности должны быть редкостью. Из всего, что нам известно о природных процессах, легко заключить, что промеж-

ность устроена именно так, чтобы выдержать те испытания, которые ей предначертаны от природы»¹.

Я не верю в необходимость использования при родах хлороформа, кроме тех редких случаев, когда невозможно подобрать симиллимум или требуется применение инструментов. Это предотвращается правильным и своевременным применением соответствующего гомеопатического лекарства, что мы и делаем с большой эффективностью. «Властная сила, управляющая действием мышц женщины, кроме тех, что в матке, более или менее подчиняется нашей воле, и, следовательно, использование хлороформа должно мешать родовому процессу, поскольку он снижает способность к произвольным мышечным усилиям»².

«Кажется милосердным просто облегчить эти тяжкие страдания хлороформом, но гораздо милосерднее облегчить их единственно правильным способом при помощи верно подобранного гомеопатического лекарства везде, где это только окажется возможным, потому что лишь таким образом приносится истинное облегчение, оказывающее благоприятное воздействие на весь процесс в целом, вместо простого паллиативного снижения болевых ощущений»³. «Если дать пациентке столько эфира, что ткани промежности

¹ G. W. Winterburn, M.D., in *Med. Advance*, xxix., p. 89.

² Guernsey, *Obstet.*, p. 179.

³ Dr. J.T. Kent, *Hom. Physician*, xi., p. 96.

расслабятся, родовой процесс приостановится⁴, не говоря уж о том, что глубокая анестезия неблагоприятно воздействует на ребенка. Следует также отметить, что скорее всего начнется послеродовое кровотечение»⁵. «Во время беременности и родов женщина как никогда восприимчива к воздействию лекарств... Анестезия маскирует симптомы, продлевает страдания в конце родов, снижает сопротивляемость организма к кровотечению, к развитию мастита и прочих проблем с молочными железами... Придерживайтесь показанного лекарства, его применение в родах принесет матери и ребенку столько же пользы, сколько приносило во время беременности»⁶. Говорят, некоторые женщины *настаивают* на применении анестезии. Но кто, в конце концов, делает назначение – женщина или врач? Женщина просто следует традиции, поскольку *не знает ничего лучшего*. Ни один сколько-нибудь зрелый врач не допустит, чтобы пациент диктовал ему курс лечения. Вот вам причина неуважения к гомеопату: он позволяет аллопатическим традициям влиять на его методы и назначения. Допустит ли уважающий себя аллопат, чтобы пациент диктовал ему гомеопатические назначения? Если пациентка решила лечиться у гомеопата, так пусть и

⁴ Мне случалось наблюдать полное прекращение родовой деятельности в результате частичной анестезии, впрочем, это следует рассматривать как исключение. – Burt's Materia Medica, p. 274

⁵ Dr. J.B. Bell, Hom. Physician, xi., p. 97

⁶ Dr. H.C. Allen, Ibid.

получает чисто гомеопатическое лечение. Чем скорее люди поймут, что профессиональный гомеопат имеет полное право настаивать на своем, придерживаться своих убеждений и требовать соблюдения гомеопатических назначений и норм, тем скорее они почувствуют почтение к этой науке и склонятся перед ней. Следование этим курсом принесет вам уважение и богатство. У врача должны быть и другие интересы, помимо стараний *сохранить клиентуру* и заработать побольше денег. Он должен обладать чувством собственного достоинства, гордиться избранной профессией. Люди не станут уважать человека, если он сам себя не уважает.

Я также не верю в необходимость антисептических инъекций во время родов. Превентивная медицина хороша на своем месте и в свое время, как и гомеопатия, но мне представляется верхом глупости использовать ее для борьбы с воображаемыми проблемами. Врач должен знать, в каких случаях имеется реальная угроза сепсиса, и если он видит соответствующие симптомы, то лучше всего сразу дать пациентке соответствующее гомеопатическое средство, которое быстро исправит ситуацию. Нет абсолютно ничего страшного в выделении лохий, если речь идет о здоровой женщине. Если же она больна, должны отмечаться симптомы, как в ней самой, так и в характере выделений, указывающие на соответствующее гомеопатическое лекарство. Это очередное вредоносное аллопатическое заблуждение, причем более чем бесполезное. Мне случилось присутствовать при родах, проходив-

ших в углу крохотной комнатки, использовавшейся всей семьей для самых разных целей, где полом служила мать сыра земля, залитая помоями и заплыванная отвратительной мокротой; где клопы передвигались по постели стройными армейскими колоннами, а белье было настолько грязным, что невозможно было заставить себя прикоснуться к нему без дрожи, где царили отвратительные запахи и вечный голод. Тем не менее, поскольку у женщины *не было влагалищной инфекции*, она спокойно, без осложнений перенесла послеродовой период и через десять дней вернулась к своим обычным обязанностям *жены* и хозяйки дома. Я пользовал и других в почти таких же условиях – и с неплохими результатами. Если бы превентивное лечение вообще имело смысл, оно, разумеется, пригодились бы именно в таких случаях. Возникает вопрос: разве чистоплотные, целомудренные женщины из приличного общества грязнее этих обитательниц жалких лачуг? Разумеется, нет. Вся проблема во врачебных ошибках, а не в несовершенстве женской природы.

В случае предлежания плаценты я полностью полагаюсь на метод, рекомендованный д-ром Гернси, который заключается в протыкании оболочек через плаценту и эвакуации околоплодной жидкости. «Палец вводится в углубление между котиледонами плаценты и этой же рукой мочевого катетер, предварительно зажатый в ладони, вводится между плацентой и оболочками во время схватки. Амниотическая жидкость *должна выводиться медленно*, и постепенно по

мере того, как выводится жидкость, будет уменьшаться кровотечение. После того, как будет выведена большая часть воды, палец должен занять место катетера и увеличить разрыв, таким образом подлежащие части можно будет сдвинуть в сторону». Этот способ подходит и для тех случаев, когда плацента располагается по центру, и когда она лишь частично, по краю прикрывает зев.

Нет случая, где гомеопатия была бы более эффективна, чем послеродовое кровотечение. Просто поразительно, как быстро прекращается обильное кровотечение после дачи правильно подобранного симиллиума. И здесь вспомогательные средства и инструменты «обычной» медицины более чем бесполезны. Врач должен быть готов быстро подобрать необходимое лекарство, однако чем скрупулезнее он отнесется к отслеживанию всей совокупности симптомов и выбору наиболее подходящего лекарства, тем больше драгоценного времени окажется спасено. Когда же будет подобран истинный симиллиум, кровотечение в рекордно короткие сроки прекратится, или, в крайнем случае, станет поддаваться контролю, то есть перестанет угрожать жизни женщины. В подобных неотложных случаях природа высказывается однозначно. Причем, чем непосредственнее угроза жизни – тем яснее. И, продолжая аналогию, *чем непосредственнее угроза жизни, тем быстрее окажется действие гомеопатического лекарства.* Это факт, подтвержденный большим опытом наблюдений за результатами правильно сделан-

ных назначений. Только те, кто доверяется правильно подобранному лекарству, застрахованы от беды в подобных случаях. Симптомы, сопровождающие развитие родового процесса очень часто указывают на лекарство, которое сможет быть использовано в случае возникновения кровотечения, или же, будучи дано своевременно, вовсе его предотвратить. Врач должен стараться не допускать возникновения неотложных ситуаций путем предотвращения возможных проблем. В большинстве случаев он может перечитать реперторий и освежить свою память по мере развития родового процесса. Подобное времяпровождение окажет ему лучшую услугу, чем сплетни и пустая болтовня с окружающими.

То же самое касается и дородовой эклампсии. Гомеопатия в холодных и умелых руках хорошего профессионала – лучшее и всегда безотказное средство в этих нелегких случаях. Страх и неуверенность лишь сковывают врача по рукам и ногам, вынуждая обращаться к сомнительным и ненадежным обычно назначаемым средствам. Наша единственная надежда в том, чтобы всегда оставаться верным званию гомеопата. Придерживайтесь гомеопатии, и тогда рано или поздно каждый станет горячим приверженцем этой целительной науки.

Мы чувствуем необходимость сказать несколько слов касательно разведений и кратности приема. Всем известно, что низкие разведения действуют быстро и эффективно, это не требует лишних подтверждений. Однако те, кто пробовал использовать высокие разведения, убеждены – и по тем же

самым причинам, то есть исходя из опыта, что они действуют куда прицельней и эффективней, чем низкие, и часто помогают в тех случаях, когда низкие разведения оказались бессильны. Исходя из реального опыта, мы всерьез убеждены, что в родах лучше всего действуют именно высокие разведения, причем скорейшее и эффективнейшее воздействие лекарства наблюдается именно в неотложных случаях. И мы видели, как сильнейшие кровотечения останавливались мгновения спустя после однократного приема соответствующего лекарства в высоком разведении. Видели, как невыносимые муки, словно по волшебству, сменялись обычными, вполне терпимыми родовыми болями, за которыми следовали легкие и быстрые естественные роды – после приема соответствующего лекарства в высоком разведении. Мой личный опыт работы с высокими разведениями был настолько удачен, что я чувствую своим долгом убедить всех, кто станет использовать данное руководство, давать именно их при необходимости. Действуйте как можно тщательнее при подборе нужного лекарства, и быстрый результат превратит вас в еще одного приверженца использования высоких разведений.

В неотложных состояниях симиллимум действует с такой быстротой, что редко возникает необходимость в повторном приеме лекарства, особенно если речь идет о высоком разведении. Если изменения в состоянии пациентки не произошло, это лишь означает, что лекарство было подобрано

неверно и следует подобрать другое. Длительность периода ожидания с момента приема лекарства до начала его действия должна соответствовать представлениям врача и согласовываться с неотложностью момента. Обычно в случае осложнений в ходе родов вполне нормально подождать с полчаса, с другой стороны, при сильном кровотечении речь идет о секундах. Если нет результата, следует подобрать другое лекарство. Если есть перемены к лучшему, разумно подождать пока не возникнет необходимость в повторном приеме того же лекарства, или пока симптомы не укажут на другое. Нет никакого единого правила, которое врач мог бы взять за основу и руководствоваться им во всех случаях жизни. Все зависит от того, верно ли он подберет лекарство, и конкретного случая. И, тем не менее, мы по-прежнему считаем, что после тщательного подбора лучше всего подождать сколько-нибудь разумное время, пока лекарство окажет свое действие (сколько можно позволить себе ждать – зависит от ситуации), и воздержаться от повторного назначения того же лекарства либо другого без однозначной необходимости. Если улучшение есть, то будет глупостью повторять то же лекарство или менять его на другое, пока это улучшение длится. Если улучшения нет в течение разумного времени, то глупостью будет ждать слишком долго. Это в первую очередь касается использования высоких разведений. Притом, что никогда не следует жалеть времени, затраченного на подбор правильного лекарства, мы, тем не менее, понимаем, что

большинство врачей поначалу все равно часто ошибаются, даже если подбирали очень тщательно. В таких случаях мы не считаем зазорным, если ситуация того требует, перейти к другому лекарству, коль скоро была обнаружена ошибка, или даже сделать несколько таких переходов, в особенности если речь не идет о частых повторных дозах, которые дают для закрепления действия. С высокими разведениями в таких повторных дозах нет нужды, поскольку истинный симиллимум действует немедленно, на что бы ни пожаловалась роженица, и таким образом, сразу можно будет понять, правильно ли был подобрано лекарство.

Часть I. Гомеопатические средства и показания к их применению

Aceticum acidum

Роды:

Кровотечения. *Послеродовые.* При этом тело холодное, бледность, дыхание затруднено. Сильная жажда, не облегчаемая питьем. Активная или пассивная. (По показаниям также рекомендуются наружные укусуные аппликации на вульву).

Общее. Тревожность. Грусть. Боится людей или окружающей обстановки. Раздражительна. Делирий, чередующийся с потерей сознания. Тяжесть в голове, жар, с набуханием височных сосудов. Холодный пот на лбу. Лицо истощенное, бледное, восковое. Щеки пылающие, горячие. Свистящее дыхание, с клокотанием в глотке и трахее. Жгучая жажда больших количеств воды. Неутолимая жажда, не облегчаемая питьем. Боль в позвоночнике, облегчается от лежания на животе. Бледная, восковая кожа. Вялые, тощие, бледные натуры. Обмороки. Приливы жара. Спрыгивает с кровати и ползает по полу, воя от боли. Сильная слабость. Отечность, в сочетании с сильной жаждой.

Acontium

Роды:

Вульва, вагина и маточный зев сухие, болезненные и не раскрываются; все эти части ощущаются как спазмированные и ригидные. Сильный дистресс, стоны, и постоянное напряжение во время схватки (или после). Боится, что не родит, или умрет, или что-нибудь обязательно пойдет не так. Прекращение схваток *от испуга или по сходным причинам*. Спазматические сокращения зева в сочетании с жаром и сухостью. Не переносит обследования из-за местной чувствительности. Обмороки. Сильное волнение и страх. Схватки неестественно бурные и сильные, жалуется, что не может дышать, не может выносить болей. Горячий пот по всему телу. Слабые схватки. Головная боль.

Выкидыш. От цистита, от испуга, с досадой, от испуга, когда страх сохраняется, и кажется, что пациентке не удастся с ним справиться, от полнокровия, от гнева. Страх, что с ней произойдет что-нибудь ужасное. Страх смерти. Головокружение при вставании из лежачего положения, боязнь повернуться, пошевелиться, встать с кровати. Тревожность в сочетании с возбуждением и сильной нервозностью. Сильнейшее кровотечение.

Кровотечение. *Активное*, в сочетании со страхом смерти, а также боязнью пошевелиться, повернуться, или что

что-нибудь случиться. Сильное головокружение, не может сесть на кровати или встать с нее. Возбуждение. *Полнокровные, темноволосые молодые женщины.* Кровотечение от испуга. Уверена, что умрет.

Судороги. Жар, сухая кожа, жажда, беспокойство, страх смерти, застойные явления в мозгу, онемение и покалывание в конечностях. У первородящих, при спазмах зева и при наличии перечисленных симптомов в начале родов, особенно.

Послеродовые схватки. Болезненные и сильные, длятся слишком долго.

Ребенок. Асфиксия, апоплексический синдром, жар, пурпурная окраска кожи, отсутствие дыхания, полное или почти полное отсутствие пульса, желтуха, офтальмия, задержка мочи.

Общее. *Сильнейшее сердцебиение;* прилив крови к голове; шум в ушах; побледнение лица при вставании; *после испуга;* страх смерти с предвидением даты; тревожность, не поддающаяся утешениям, жалобные стоны; упрекает окружающих по незначительным поводам, брюзглива, нетерпелива, беспокойна, мечется в мучениях. Сверхчувствительна, не переносит звуков и света, прикосновений, не согласна быть неукрытой. Обморок при вставании из лежачего положения, с побледнением лица или приливом крови к голове. Сильная жажда. Ощущение, как будто весь мозг выдавится через лоб.

Aletris farinosa

Выкидыши. *Привычный* выкидыш у хилых женщин, с дряблыми мышцами, анемичных, даже после того, как кровотечение установилось; тяжесть в матке; тенденция к опущению матки; общая слабость тела и души; слабость из-за недостаточного питания или потери жидкостей. Диспепсия.

Кровотечение. Пассивное. Меноррагия, обильное кровотечение, кровь черная, со сгустками, полнота и тяжесть в области матки.

Amyl nitrite

Роды:

Спазматические боли и спазм шейки матки; приливы жара при каждой схватке и сильные головные боли. *Очень болезненные* роды из-за спазма шейки матки.

Судороги. Сразу после родов, с интенсивным приливом крови к лицу и к голове в момент пароксизма, из-за чего они становятся красными и горячими. Непрерывные спазмы. Мышцы становятся ригидными. Пронзительные крики.

Общее. Не переносит тепла, непременно сбрасывает все одеяла, открывает окна и двери, даже в холодную погоду. Жар, пульсация, чувство сильного переполнения в голове. Тяжесть в голове, головокружение, спутанность сознания в сочетании с протрацией. Выпученные, пристально уставившиеся глаза, остекленелый взгляд во время судорог. Пульсация в ушах. Чувство сжатия в горле, распространяющееся на грудь. Затрудненное дыхание.

Antimonium crudum

Кровотечение. Маточное, с отчетливым чувством давления в матке, как будто что-то должно выйти наружу. Слегка слизистое.

Общее. *Белый язык*, тошнота и рвота. Капризна, брюзглива, *не любит, чтобы ее трогали или на нее смотрели*. Сильная печаль и горестное настроение. Обидчива, не хочет ни с кем разговаривать.

Antimonium tartaricum

Роды:

Ригидность шейки матки с сильной тошнотой и нарушениями дыхания, особенно у женщин с хроническими и подострыми заболеваниями органов малого таза в анамнезе.

Судороги. После рождения ребенка. Конвульсивные подергивания почти всех лицевых мышц.

Ребенок. Клиническая смерть; клочотание слизи в горле; бледный, хватает ртом воздух, дыхание отсутствует, хотя пуповина еще слабо пульсирует. Асфиксия.

Общее. Дрожание рук и головы. Жалобные плач и нытье. Многочисленные жалобы, отчаяние в выздоровлении. Головокружение, когда отрывает голову от подушки. Лицо выражает тревогу, отчаяние. Много клокочущей слизи в горле. Быстрое, отрывистое, затрудненное и усиленное дыхание. Раздражительность. Часто зевает и потягивается. Сонливость. Изнеможение.

Apis mellifica

Роды:

Выкидыш. От запора, от полнокровия. На ранних сроках, на втором месяце, на третьем и четвертом месяцах, с обильным кровотечением. Схваткообразные боли в области матки, распространяющиеся на бедра. Всепоглощающая боль. Жалящая боль в области то одного, то другого яичника, повторяющаяся все чаще и чаще пока не наступят родовые схватки; затем боль и истечение. *Моча скудная* (или профузная). Отсутствие жажды. Длительный, тяжелый запор. Беспокойство. Зевание.

Кровотечение. Активное. Темное. Обильное, с тяжестью в животе; обморочное состояние. Сильный дискомфорт, зевание. Красные пятнышки, похожие на пчелиные укусы на коже, жалящее ощущение в области яичников или еще где-нибудь. Вызванное или подкрепленное ненавистью или завистью. Неугомонность.

Судороги. Сонливость, моча скудная, сильноокрашенная, с белком. Дрожь, подергивания, мышечные сокращения. С судорожным смехом.

Общее. Боль, как пчелиные укусы. Отсутствие жажды. Скудное мочеиспускание. Сильная плаксивость, не может перестать плакать. Раздражительность. Суетливость. Ничто не удовлетворяет. Неугомонность. Зевота. Повышенная чув-

ствительность к прикосновениям и легкому надавливанию. Усталость, чувство разбитости по всему телу. Апатия. Потеря осознания. Глубокий сон, прерываемый пронзительными вскриками. Бормочет в бреду. Ужас смерти. Головокружение со спутанностью сознания, усиливающееся при сидении, достигающее максимума при лежании с закрытыми глазами; тошнота и головная боль. Общее чувство удушья.

Аросунум сaннaбiнум

Кровотечение. Продолжительное или приступами. Обильное. Жидкое или с большими сгустками и ошметками. Сильное расстройство желудка. *Осложненное мочеиспускание и отечность.* Тошнота, рвота, сердцебиение; слабый, частый пульс, при движении; обморок при подъеме с подушки. Кровь коричневого цвета.

Общее. Растерянность, уныние, глупость. Лицо опухшее, хуже, когда ложится. Чувство общей, но преходящей слабости.

Argentum nitricum

Выкидыш. Предрасположенность к выкидышам.

Кровотечение. Замешательство, отупение и боль в голове, усиливающаяся при малейшем движении. *Короткие промежутки времени кажутся ей очень долгими.* Кажется, что все делается очень медленно. Отрыжка воздухом приносит облегчение. Хуже от движения.

Судороги. Предчувствует начало припадка. Ощущение, как будто желудок лопнет от газов, отмечается облегчение после отрыжки, которая происходит внезапно. В промежутках между приступами находится в постоянном движении, мечется из стороны в сторону; или она может некоторое время спокойно лежать, после чего становится крайне беспокойной, пока не наступит приступ. Бурные спазмы, предвараемые ощущением, будто все тело расширяется, особенно голова и лицо.

Ребенок. Офтальмия, обильные, гнойные выделения.

Общее. Апатия. Молчаливость и угрюмость. Время ползет медленно, кажется, что окружающие делают для нее все очень медленно. Легко возбуждается, нервничает, раздражается, тревожится. Головная боль, легче от тугой повязки. Головокружение, как будто ее вертят. Хочет сахару. Громко рыгает с сильным облегчением. Ощущение занозы в горле или в других частях тела. Крайняя слабость, особенно в но-

гах и в икрах ног. Обморочное ощущение. Почти постоянная отрыжка воздуха после еды, чуть ли не до следующего приема пищи. Боли в спине и в нижних конечностях.

Arnica montana

Роды:

Утомление матки, приводящее к слишком слабым или нерегулярным схваткам, с чувством усталости. Во время схваток прилив крови к лицу, голова горячая, в то время как все остальное тело может оставаться холодным. Схватки малоэффективные, но настолько жестокие, что доводят почти до безумия. Выводящие из себя боли. Ложные схватки. *Ноющие боли с ощущением разбитости* в любой позе, часто меняет позу. Обмороки от повреждений, от усталости, от уколов возле сердца. *Горячая голова и холодное тело*. Не переносит обследований из-за местной чувствительности. Слабые схватки со стойким желанием сменить позу. Ноющие боли в спине во время родов, в сочетании с гиперчувствительностью к боли. Схватки слабые и короткие. Болезненность, видимо, связанная с чрезмерной чувствительностью шейки матки к давлению головки ребенка.

Выкидыш. *От падения, от шока, от ушиба, от сотрясения.* Кровотечение безболезненное, боли без кровотечения, или боли и кровотечения вместе. *Ноющие боли с ощущением разбитости*, ей больно двигаться, шевеления ребенка причиняют ей боль (если срок уже достаточно большой, чтобы ощущать шевеления); Ощущение, что ребенок лежит косо. Боль всепоглощающая. Кровать кажется слишком жесткой.

Выделения продолжительные, обильные, ярко-красные, со сгустками или кровянистой слизью. Боли в области матки, похожие на родовые схватки, от усилий. Угрожающая септицемия после выкидыша (*гнойная*).

Кровотечение. От усталости, сотрясения или шока. Постоянно ярко-красное или со сгустками, с или без боли. Тошнота под ложечкой. Голова горячая, а тело холодное. Ноющая боль, как от ушиба в области матки. Активное. Ярко-красное, с крупными сгустками и комками. От травм, длительных или оперативных родов. «Матка широко раскрытая, обильное бледно-красное кровотечение с большими черными сгустками».

Задержка плаценты.

Судороги. Голова горячая, а тело холодное или нормальной температуры. Сильный, хорошего наполнения пульс, при каждой схватке кровь сильно приливает к голове и к лицу. Симптом паралича левой половины тела. Потеря сознания. Бесконтрольное мочеиспускание и дефекация. Вздутие живота после родов.

Послеродовые схватки. Arnica (в высоком разведении) часто полностью предотвращает появление послеродовых болей, если ее дать (при отсутствии противопоказаний) сразу после родов, сопровождавшихся травмами отдельных органов и тканей и общим перерастяжением мышц. Жестokie боли. Помогает вернуть органы и ткани в их первоначальное состояние. *Боли усиливаются во время кормления.*

Ребенок. Посттравматические тетанические судороги; горячее лицо, холодное тело; прерывистое дыхание, дрожь в конечностях. *Асфиксия.*

Общее. Последствия механических повреждений. Голова горячая, тело холодное. Ощущение как от ушиба в любой части тела. Чувство сотрясения, как от падения. Безысходность. Брюзгливость. Чувствительность. Равнодушие. Сварливость. Бездумная веселость; полная раскованность и озорство. Отрыжка с привкусом крутого яйца. Болезненная задержка мочи. Черно-синие пятна на теле. Страх, что проходящий мимо человек ударит или дотронется. Подергивания мышц. *Полный упадок сил.* Кровать кажется слишком жесткой. Шевеления плода вызывают болезненное, как от ушиба ощущение в животе, кажется, что ребенок лежит косо, и это его положение вызывает постоянные боли. Ноющие боли в лобковом или крестцово-подвздошном сочленении, затрудняющие передвижение в период беременности, без острой боли и дискомфорта.

Arsenicum album

Роды:

Истощение или прострация, когда малейшее усилие вызывает обморок. Желание пить холодную воду частыми глотками. Озноб, хочет быть тепло укрытой. Бледное опухшее лицо. Чувство сильной усталости после малейшего усилия. Сильное беспокойство и страх. Влагалище и мягкие родовые пути ригидны настолько, что с трудом проходит средний палец.

Выкидыш. См. «Общее».

Кровотечение. Режущие, жгучие боли. Слабая сопротивляемость организма, когда появляются язвы. Темная кровь, появляющаяся внезапно.

Судороги. Общая отечность. Восковое, опухшее лицо. Зябкость, конечности холодные и липкие. Белок в моче, моча темная и скудная. Рвота. Понос. Сильная жажда. Дыхание отрывистое, затрудненное, возбужденное. Сильная прострация. Дрожание рук. Каждый приступ сменяется крайним изнеможением и беспокойностью. Бледна как смерть, но теплая. Внезапно начинает биться в сильных судорогах, только для того чтобы снова впасть в каталепсию. Опистотонус. Пена на губах.

Ребенок. Тетанические судороги, с пугающим сотрясением конечностей. Ребенок лежит как мертвый, бледный, но

теплый, иногда без дыхания; черты лица искажены. Конечности тугоподвижные, особенно колени и стопы. Кожа сухая, как пергамент.

Общее. Сильная тоска. Беспокойность, нервно мечется и рвется в разные стороны, за каждым порывом следует изнеможение. Чувствует изнеможение особенно при движении, выглядит бледной и осунувшейся. Сильное чувство жжения. Страх смерти, нет смысла что-либо делать, раз она все равно умрет. Бред. Грусть. Быстрый упадок сил. Затвердение конечностей. Страдания часто вызывают дрожь, понижение температуры, тоску, протрацию. Хочет, чтобы тепло укутали. Хочет пить воду частыми маленькими глотками. Выражение лица тревожное, но не дикое. Дыхание отрывистое и тревожное. Сердцебиение сопровождается сильным страданием; не может лежать на спине. Частые обмороки. Чувство, что теплый воздух дует вверх от спины к голове. Задержка мочи после родов, не чувствует желания помочиться, хотя со временем это должно пройти. Периодические зубные боли во время беременности, возникающие чаще всего ночью, доводящие пациентку почти до неистовства.

Asarum europaeum

Роды:

Выкидыш. *Привычный выкидыш.* Угроза возникает от повышенной нервной чувствительности; от одного лишь предположения, что с ней может случиться что-нибудь неприятное, возникает ощущение дискомфорта, моментально лишаящее ее способности думать и действовать. Выделения черные.

Общее. Всепоглощающий озноб, желание живого тепла. Ощущение, что все тело, или часть тела были стиснуты вместе. *Сильное нервное раздражение.* Чувство, как будто бы тело парит в воздухе. Настолько чувствительна и нервозна, что даже при мысли о царапанье по шелку или другому сходному материалу дрожь пробегает по ней, и усиливаются все ее симптомы. Разрывающая боль от одного подвздошного гребня до другого. Боль в спине как от ушиба. Общее чувство утомления.

Atropinum

Роды:

Судороги. После нормальных родов бурные конвульсии, бессознательное состояние, ярко-красное, искаженное лицо; закатывает глаза; скрипит зубами; кровавая пена у рта; согнутые большие пальцы на руках; разбрасывает конечности; в промежутках между приступами расчесывает тело и впадает в глубокий сон.

Aurum metallicum

Роды:

Схватки доводят ее до отчаяния, так что она готова выпрыгнуть в окно и убить себя. Приливы крови к груди и к голове. Сердечные palpitations. Схватки нерегулярные, а когда она встает, то вместо того, чтобы снова спокойно лечь, она бросается на кровать.

Общее. Сильная тяга к самоубийству – желание выбраться из окна или спрыгнуть с высоты. Желание свежего воздуха. Бурная истерика, сопровождаемая отчаянными действиями. Душевные муки и глубокое горе. Кажется, что нет друзей. Во всем видит темную сторону; причитает и молится. Бездна надежды и отчаяние, не верит в себя, и думает, что и другие в нее не верят. Ментальная раздражительность. Печаль, чувство, что все против нее, жить не хочется, и мысли о смерти даже приятны. Предметы кажутся как будто разделенными по горизонтали.

Belladonna

Роды:

Схватки начинаются и проходят внезапно, с очень быстрым переходом давления на низ, точно все органы таза сейчас выдавятся наружу. *Спазм шейки матки*, шейка горячая, болезненная, красная и слегка влажная (при *Aconitum* – сухая).

Шейка матки тонкая и ригидная, много спазматических сокращений (а при *Gels.* – плотная и ригидная). Роды медленные и утомительные, периодически ощущается только давление на крестец. Жестокие боли, причиняющие сильные мучения, при этом ребенок не продвигается вперед. Схватки исчезают совсем, или они недостаточные. Тянущие боли от спины к бедру. Чувство, что спина вот-вот переломится. Лицо горячее, пульсирующая головная боль. Очень красное лицо и выпученные глаза. Чувствительность к шуму, свету, скрипу кровати. Внезапное исчезновение схваток у первородящей. Пожилые первородящие с ригидностью мышц. Не переносит осмотров из-за повышенной нервной возбудимости. В отдельных местах жар и повышенная чувствительность. Обмороки. Ложные схватки. Кровать кажется слишком жесткой. Матка в форме песочных часов. Стоны. Околоплодные воды отошли, но спазм шейки остается. Пульсация сонных артерий. Все движения быстрые.

Выкидыш. Жестокие боли и болезненно-тянущие ощущения по всему телу, с чувством растяжения и сжатия. Схватки и выделения начинаются внезапно, и внезапно же прекращаются. Давление на влагалище, как будто все внутренние органы сейчас выдавятся наружу. Боли в спине, как будто она ломается или вот-вот сломается. Кровянистые выделения в больших или меньших количествах ощущаются как очень горячие. Застой крови в голове, стоны приносят ей временное облегчение. Хуже от малейшего сотрясения. Красные лицо и глаза. Преобладает кровотечение. Кровотечение со сгустками, наступает и проходит внезапно; темного цвета; зловонное; ярко-красное; горячее; обильное; перемежающееся. Боль в области матки, по типу колик, схваткообразная. От застоя крови в матке. Роженице неприятен малейший шум.

Кровотечение. Обильное выделение *ярко-красной горячей крови с давлением на низ*, или наружу, словно все стремится вылететь наружу. Боли в спине, будто она вот-вот сломается. Кровь со сгустками, иногда темная и зловонная. Течет в промежутках между послеродовыми схваткам. Горячие, красные лицо и голова, выпученные глаза и усиленный пульс. Усиливается от света, звука, движения и малейшего сотрясения. Большие зловонные сгустки. От испуга, от задержки плаценты. После естественных родов в особенности.

Задержка отделения плаценты. Красное лицо и выпученные глаза. Сильные страдания и стоны. Горячее и сухое

влагалище. Обильное истечение горячей, быстро свертывающейся крови. Легкое сотрясение заставляет страдать. Матка в виде песочных часов. Сухость и жар поверхностей тела.

Судороги. Судорожные движения мышц лица и конечностей. Паралич правой стороны языка. Потеря речи и затрудненное глотание. Расширенные зрачки. Красное или синюшное лицо. Каждая схватка вызывает новый приступ. Бессознательное состояние или частичная потеря сознания между приступами или глубокий сон, гримасы, роженица вздрагивает и вскрикивает, страшные видения. Дрожь и подергивание мышц между приступами. Роженица кажется оглушенной, полубессознательной. Пена на губах (с гнилостным запахом). У роженицы может быть холодное бледное лицо и дрожь. Застывшие, судорожные глаза. Непроизвольные мочеиспускание и дефекация. Сильная пульсация сонных артерий (первое лекарство, о котором следует подумать).

Послеродовые схватки. Наступают и проходят очень быстро. Давящие боли, точно все содержимое малого таза выдавливается наружу из влагалища. Каждое сотрясение болезненно. Лохии ощущаются горячими. Струя усиливается с каждой схваткой. Не может выносить света, звука, сотрясения кровати. Прилив крови к голове и глазам.

Ребенок. Асфиксия; апоплексическая форма; очень красное лицо; выпученные глаза; тризм с неожиданным вздрагиванием и опусканием тела и конечностей. Неровное, спазматическое дыхание; отсутствие движений; присталь-

ный взгляд; неспособность глотать, затем начинаются судороги.

Общее. Значительная быстрота ощущений или движений; быстрый взгляд, быстрые движения глаз, схватки начинаются и проходят с большой скоростью. Боль может длиться некоторое время, и затем мгновенно пройти. Сильная дрожь и подергивание мышц. Делирий и притупление сознания; с бредом и предрасположенностью к повреждениям, ударам, укусам и т. д. Стоны, приносящие облегчения. Фантастические видения, галлюцинации, жуткие лица, черные собаки, насекомые и т. д. У роженицы дикий взгляд, остолбенелый вид. Пульсация и колотье. Роженица вдавлиывает голову в подушку, постоянно мотает головой из стороны в сторону. Красное лицо, частая смена цвета, то очень бледное, то внезапно краснеет; черты, искаженные от боли. Полнокровие. Болтлива, и вдруг замолкает. Вздорность, на фоне бурной радости. Чувствительность к шуму, скрипу и т. д. Красные глаза на фоне румяного лица. Застой крови в половых органах, возможны кровянистые выделения. Боль в спине, будто она вот-вот сломается. Головная боль в лобной части, с давлением и светобоязнью. Кровать кажется слишком жесткой. Предметы видятся в дымке, перевернутыми или двоятся. Жгучая или пульсирующая зубная боль. «Если *Belladonna* не помогает в белладонновом случае, давать *Lachesis*» (Фаррингтон).

Ворак

Роды:

Во время схваток боли направлены вверх, голова ребенка отклонена назад. Боли спазматические, более острые в желудке, чем в матке, схватки сопровождаются сильной и частой отрыжкой. Схватки слишком слабые. Прекращение схваток. Ложные схватки. Роженица боится движения вниз. Весьма чувствительна к любому шуму, шуршанию бумаги, скрипу двери и т. д.

Общее. Сильная нервозность, пугается от любого шума. *Сильный страх движения вниз любого рода.* Смятение и страх. Придирается. Переменчивое настроение. Затхлый запах изо рта. Привкус подвальной плесени во рту во время кашля. Весьма чувствительные язвочки во рту, легко кровоточат.

Bryonia alba

Роды:

Обморок от любого движения, даже когда не требуется никакого усилия. Часто вздыхает. Жажда холодной воды в больших количествах. Тянущая или режущая боль от бедра до пятки, становится хуже от прикосновения или движения.

Выкидыш. Выделяется темно-красная кровь. Запор; стул сухой, как будто обожженный. Боль в спине, становится сильнее при движении. Жгучая боль в матке. Боль по всему телу, в конечностях и т. д. Сухие губы и рот. Тошнота, когда садится в постели. Стремление к тишине. Голова раскалывается от боли. Жажда большого количества жидкости.

Кровотечение. Обильное. Темная жидкая кровь. *Темно-красная кровь, с болями в спине, голова раскалывается от боли. Сухие губы и рот; сильная жажда.* Тошнота и обмороки, когда садится в постели, или даже поднимает голову от подушки. Усиливается при *малейшем движении любой части тела*, даже головы или ноги, или же при разговоре.

Судороги. Не может терпеть собственных движений или когда ее двигают другие. После того, как спазмы взяты под контроль, и устанавливается наполненный и сильный пульс, жажда, болезненность нижней части живота, потливость и сухие запекшиеся губы.

Послеродовые схватки. *Возникают от малейшего дви-*

жжения и даже от глубокого вдоха. Хочет лежать в полном покое. Голова раскалывается от боли. Запекшиеся губы и сухость во рту и в горле. Жажда большого количества холодной воды.

Общее. Женщина быстро устает и стремится к покою. *Ухудшение состояния от любого движения*, даже от глубокого вдоха. Не выдерживает ментального или физического беспокойства. *Не может сесть в кровати*; ей несколько легче ворочаться с одного края кровати на другой. Нервозность. Подавленность духа; тревожность; мрачность; упрямство; раздражительность; хочет остаться одна. Шум ее раздражает. Хочет сделать глубокий длинный вдох, но ей это не легко, поскольку при этом возникает ощущение, что легкие не смогут так растянуться. Тошнота или рвота, спровоцированная движениями. Жгучая, колющая или пронзительная боль. Жажда больших количеств воды. Озноб, сопровождающийся жаждой. Голова мутная, болит, тяжелая. Лицо горячее, красное. Рот и губы сухие, что может сопровождаться или не сопровождаться жаждой. Давление в области сердца. Любая точка кожи болит при надавливании. Подходит брюнеткам с темными волосами, кожей и глазами, с плотными, мясистыми мышцами.

Cactus grandiflorus

Роды:

Спазматические сокращения внутреннего зева матки у женщины, страдающей от сердечных спазмов (циркулярных волокон) и дисменореи. Болезненные сжатия вокруг области таза, постепенно поднимающиеся к животу. Ощущение переполненности в груди.

Выкидыш.

Кровотечение.

Задержка отделения плаценты.

Общее. Не говорит ни слова и не отвечает окружающим. Плачет, не зная отчего; утешения раздражают. Глубокая грусть. Лицо с синюшным оттенком; холодный пот; бледность; временами кровь приливает к лицу. Сжатие в различных частях тела. Тяжесть в груди, как от большого веса, дыхание затруднено. Ощущение, как будто железная рука не дает груди двигаться нормально. *Сердце:* сжатие, как будто железной рукой; колющая боль; тяжесть; тупая, тяжелая боль; боль в верхушке сердца, стреляющая вдоль левой руки; учащенное сердцебиение, сопровождаемое головокружением. Все тело ощущается, как в клетке, причем ее прутья затягиваются все туже и туже. Ощущение, как будто рой ос движется от пекторальной области к голове.

Calcareo carbonica

Роды:

Следует посмотреть анамнез. Истощение у бледных, вялых женщин; сильная потливость в районе головы и в верхней части тела; любая нагрузка сильно утомляет; холодные, липкие, влажные ступни. Боль в бедрах. Жалующие боли в шейке матки или внутреннем зеве, пронизывающие боли. Подергивающие потягивания вниз сторон нижней части живота. Сжимающие и режущие боли в гипогастрии. Тянущая боль в паховой области. Жгучие боли в гениталиях. При вставании появляются головокружения. Малейшее дуновение холодного ветра почти непереносимо.

Выкидыш. У бледных, вялых женщин. Боль в пояснице. Колики или схваткообразные боли в маточной области. Боль в чреслах. Анемия, бели. Склонность к кровотечению. Варикозное расширение вен на половых органах. Как правило, слишком обильные и слишком частые менструации. Холодные и влажные ступни. Головокружения. При назначении следует руководствоваться, прежде всего, анамнезом.

Кровотечение. Следует посмотреть анамнез. У бледных, вялых женщин или полнокровных, светловолосых, со слишком обильными, продолжительными и частыми менструациями. Холодные, влажные ступни. Безболезненное кровотечение; обильное; ухудшение от движений; ярко-красная

кровь; вызывается даже легким возбуждением. Желудок раздут в форме перевернутого соусника. Головокружение при наклоне вперед; ухудшение при распрямлении или при подъеме по ступенькам.

Общее. Настоящая конституция лейко-флегматическая конституция. Чувствует, будто сейчас сойдет с ума. Меланхолия. Хочется плакать. Пугающие предчувствия. Вялость мускулов. Лицо бледное, опухшее, с синими кругами под глазами. Часто возникает желание глубоко вздохнуть. Судорожные сокращения мускулов. Утомляемость. Легко потеет. Пот обильнее на голове, груди и в верхней части тела. Сильная тяжесть во всем теле. Прилив крови к голове. Отвращение к открытому пространству. Зябкость, с желанием тепла и желанием укрыться.

Camphora

Роды:

Схватки слабые, или прерываются, и кожа становится холодной, сухой и сморщенной. Не хочет укрываться; беспокойство. Мраморная холодность всего тела; очень слабый пульс. Обмороки. (Используйте высокие потенции.)

Выкидыш. Во время эпидемического гриппа. Расположенность к катарам. Бледная, дряблая, холодная кожа, с общей предрасположенностью к катаральным выделениям.

Ребенок. Там, где не работает *Ant. tart.*, при тех же симптомах. Уплотнения на коже нижней части живота и бедер, быстро увеличивающиеся и уплотняющиеся; иногда сопровождаются глубоким покраснением, распространяющимся почти по всей нижней части живота и бедрам; сильная лихорадка, сопровождающаяся испугом и тетанической судорогой, выгибается назад.

Общее. Поверхность тела холодная на ощупь, но, несмотря на холод, пациентка сбрасывает с себя все покрывала и не желает оставаться укрытой. Лицо выглядит синеватым и осунувшимся. *Тревожность.* Бледное лицо. В глазах ощущение, как будто все объекты слишком яркие и сияющие; зрачки сужены. Судороги в икрах. Слизь в дыхательных путях. Упадок жизненных сил, сопровождающийся бледностью. *Ярко выраженная слабость.* Ментальная воз-

будимость. Размышления о существующей боли приводят к ее исчезновению. Ощущение большой легкости. Исчезновение всех чувств, даже осязания. Ступор. Обмороки. Дрожь и учащенное сердцебиение, сопровождаемое тревогой. Мышечные судороги, сопровождаемые невозможностью оставаться укрытой.

Cannabis sativa

Выкидыш. В случаях, когда женщина болела или продолжает болеть тяжелой гонореей. А также при слишком частых половых сношениях.

Общее. Упадок духа в первой половине дня, веселость во второй половине дня. Жалобы на мочеиспускание; затрудненное мочеиспускание; боли во время или сразу после него; жжение в начале и в конце него. Ощущение, как будто на нее льют горячую воду. Ощущение, как будто холодная вода капает ей на сердце; на голову; на кровать; из анального отверстия; или в отдельных частях тела. Ощущение усталости; тепла. Одышка.

Cantharis

Роды. См. «Общее».

Выкидыш. Постоянное (иногда безрезультатное) *желание помочиться*, каждый раз выделяется лишь несколько капель, что сопровождается режущей, жгучей болью. Боль превалирует. Прилив крови и изъязвление матки. Кровотечение темной кровью.

Кровотечение. Сильная раздражимость шейки мочевого пузыря. Практически постоянное желание помочиться, выделяется лишь несколько капель, с режущей, жгучей болью во время мочеиспускания.

Задержка отделения плаценты. С позывами на мочеиспускание; жгучее и практически постоянное желание помочиться. Жгучая боль в тазовой области нижней части живота и в спине; нижняя часть живота чувствительна; склонность к лихорадке; рвота; сильная тоска и подавленность; отек губ зева матки. Судороги.

Судороги. Сопровождается симптомами дизурии или водобоязни. Яркий свет на предметах, вид воды, звук текущей воды или питье, а также простое прикосновение, по-видимому, вызывают новые спазмы, обычно весьма сильные. Возобновление спазмов от прикосновения к горлу или к болезненным частям тела. Лицо опухшее, одутловатое. Моча жгучая, темная и скудная, при частых позывах. Повышенное содер-

жание белка в моче, цилиндры, слизь и твердые образования в моче. Влагалище опухшее и чувствительное. Сопровождается задержкой отделения плаценты или оболочек, глаза яркие, зрачки сильно расширенные. Лицо бледное и желтоватое, с выражением глубокого страдания.

Общее. Стоны. Жалобы. Беспокойство. Лицо бледное; несчастное; болезненного вида. Моча скудна; мочеиспускание болезненно; моча с хлопьями; похожа на гной; красноватая. Ложные позывы к мочеиспусканию, становятся сильнее стоя, еще сильнее при ходьбе. Сильная режущая и жгучая боль в мочевом пузыре перед, во время и после мочеиспускания. Исторгает остатки погибшего плодного яйца, зародыш или плаценту, в зависимости от обстоятельств. Ухудшение от питья холодной воды; во время мочеиспускания; после него. Раздражительность. Нытье и жалобы. Вспышки ярости, сопровождаемые криками, лаем и драчливостью; возобновляются при виде ярких, сверкающих предметов; а также при прикосновении к горлу и при попытках попить воды. Во время и после схваток выглядит мертвой. Жажда, сопровождающаяся отвращением к любым жидкостям. Тревога по поводу сердца; учащенное сердцебиение. Слабость. Прострация. Склонность к обморокам. Дерущая и саднящая боль во всем теле; каждая часть тела весьма чувствительна.

Carbo vegetabilis

Роды:

Схватки слишком слабые или прекращаются от сильного истощения. Варикозное состояние влагалища. После большой потери жизненных соков или в результате иного истощающего воздействия предшествовавшей или существующей болезни. *Обмороки* от слабости, причиненной потерей жизненных соков; после пробуждения. Отрыжка, иногда воздухом.

Выкидыш. Менструальные выделения слишком бледные или скудные, или же обильные и преждевременные, сопровождаются отчетливым варикозным состоянием половых органов; частая головная боль; спазмы стенок живота.

Кровотечение. Пассивное. Продолжительное. Женщина уже холодная, кожа синеватая или мертвенно бледная; пульс учащенный и слабый. Крайний упадок сил. Жгучая боль вокруг крестца и нижней части позвоночника, сопровождающаяся жгучими болями в груди и затрудненным дыханием. Пациентка требует, чтобы ее обмахивали. Сильный зуд во влагалище и анусе. Тянущие боли от нижней части живота к спине. Практически никакого беспокойства; никакой тревоги. Кровь бледная или густая, но может быть различного вида.

Судороги. Коллапс и прекращение сердечной деятельно-

сти; родовые схватки слабые и прерывистые, сопровождаются сильным истощением; дыхание холодное и прерывистое, холодные ладони и ступни; желает, чтобы ее обмахивали, нужно больше воздуха.

Послеродовые схватки. *Боли появляются в частях тела, удаленных от тазовой области, причем приступы и послабления чередуются так же регулярно, как если бы это было в матке.*

Общее. Ступор; коллапс. Желает, чтобы ее обмахивали, чтобы были открыты окна, нужно больше воздуха. Голова горячая. Тоска. Раздражительна. Задержка газов. Дыхание затруднено. Пульс прерывистый; слабый; мягкий, нитевидный. Жалящие, колющие или жгучие боли во внешних органах тела. Ощущение клина в спине. Облегчение после отрыжки. Мысли путаются. Безразличие. Головная боль, как будто сдавлена верхняя часть головы. Лицо Гиппократата; очень бледное; зеленоватое; нос заострен; холодный пот; озноб; щеки красные, покрыты холодным потом. Жизненная сила почти истощена; лежит, как мертвая; дыхание холодное. Обморочная слабость.

Caulophillum

Роды:

Чрезвычайно ригидный внутренний зев матки; схватки, как будто шейку матки покалывают иглками. *Острые, спазматические*, прерывистые, краткие, нерегулярные схватки, *без развития*. Схватки затухают от истощения, в связи с большой продолжительностью родов; пациентка слишком слаба, чтобы развились нормальные схватки. Жажда и лихорадка. Спазматические, безрезультатные схватки в различных областях нижней части живота. Сильное истощение. Сильные сокращения дна матки и сжатие внутреннего зева матки; спазматическое сокращение внутреннего зева. Тянувшие боли в связках матки. Спазматические боли, переходящие с места на место, но *не* идущие в нормальном или правильном направлении. Тошнота и спазматические боли в животе. Обильное выделение слизи из влагалища. Мучительные, безрезультатные схватки в начале родов.

Практически основное средство при *ложных схватках*. Останавливает ложные и начинает настоящие схватки.

Выкидыш. Сильная боль в спине и в лоне, сильный недостаток маточного тонуса. Слабые маточные сокращения, мучительные, нерегулярные и сопровождающиеся *очень слабым кровотечением*. Боль преобладает. Пассивные выделения. Спазматические потуги. Васкулярное возбуждение. От

маточной конгестии, пассивной; от истерии; от маточной инерции; от ревматизма.

Кровотечение. Истощение матки. *Обильное* кровотечение из расслабленной или слегка сокращенной матки *после стремительных родов*. Кровь пассивно сочится. Дрожь и слабость во всем теле, сопровождающие истечение крови, при этом – ощущение истощения. Матка мягкая и расслабленная, сокращается очень слабо. Особенно после естественных или стремительных родов.

Задержка отделения плаценты. Спазматическая задержка; от истощения и слабости; нет сокращений; обильный поток крови.

Судороги. Спазмы во время родов, при очень влажных гениталиях и спазме внутреннего зева. Весьма слабые и нерегулярные схватки. Чувствует себя очень слабой, лихорадка, жажда.

Послеродовые схватки. Спазматические боли в нижней части живота (или в других частях тела), иногда отдающиеся в паху. *Особенно после продолжительных и изнурительных родов*. Боли в спине и груди. Пациентка нервная, слабая, не может уснуть.

Общее. Согласно Фаррингтону, основной признак – перемежающиеся боли. Обычно они острые и судорожные, отдаются в мочевом пузыре, паху и нижних конечностях. Предельная атония матки. У нервных женщин, которым боль кажется невыносимой. Истощение всего организма. Ино-

гда пациентка почти не может говорить, настолько ее голос слаб. На протяжении последних недель беременности возможны ложные схватки, состоящие из болезненных похожих на потуги ощущений в гипогастрии. Пациентка капризна, легко расстраивается. Головная боль, давление под глазами. Невралгия влагалища, при этом влагалище повышено раздражительно, а боль и спазмы сильные и продолжительные. Истерия и смещение матки. Ревматизм, особенно *мелких суставов*. Болезненная ригидность пораженных суставов. Некоторое головокружение, сопровождающееся помутнением зрения. Пятна на лбу, сопровождаются белыми. Жажда.

Causticum

Роды:

После истощения, бессонницы по ночам, перенесенной утраты, или какого-то депрессивного фактора. Основные жалобы – угнетающая, саднящая, ноющая боль в спине, сопровождающаяся спазматическими схватками. *Инерция матки, сопровождаемая выраженным расслаблением тканей* и изнеможением. Паралитическое состояние дна мочевого пузыря, с неспособностью помочиться. Ощущение онемения. Схватки неэффективные, нерегулярные; есть раскрытие внутреннего зева, но женщина устала и капризничает.

Судороги. Сопровождаются криками, скрежетом зубов и резкими движениями конечностей. Одышка при учащенном дыхании. Подергивание в сочетании с жаром головы и холодом в ладонях и ступнях.

Общее. У золотушных женщин, или же у женщин со слабым или изнуренным видом. Эта слабость может происходить от длительной скорби или от болезненного состояния. Кожа часто имеет грязно-белый вид. Грусть. Нытье. Очень подозрительна и недоверчива. Шум в ушах вообще; постоянный рев около ушей; гудение или звон в ушах; эхо от всех звуков в ушах. Веки падают. Неожиданные частые потери зрения, с ощущением пленки перед глазами. При кашле обязательно проглатывает то, что выделяется. Сыпь на коже,

сопровождающаяся жжением и зудом, как при крапивнице. Движение кажется затрудненным, мускулы сокращены. Пона фантастических страхов. Задержка мочеиспускания, при частых и настойчивых позывах; выходит всего несколько капель. Короткое дыхание. Колотье в области сердца. Колотье в спине; в пояснице слева. Боль в копчике, как от ушиба. Слабость и дрожь. Упадок сил, как при обмороке. Беспокойство в теле. Зевота и потягивание.

Chamomilla

Роды:

Спазматические схватки, выводящие роженицу из себя. Очень чувствительна к схваткам; еле может их переносить; стремится уйти от себя и от боли; практически сходит с ума; очень беспокойна. Очень капризна, возражает на все, иррациональна, брюзглива, не может выносить никого рядом; не может отвечать вежливо. Очень подозрительна или резко кричит. Матка в форме песочных часов; жажда; желание свежего воздуха; беспокойство; из влагалища выделяется большее или меньшее количество темной свернувшейся крови. Схватки прерываются. Схватки слишком слабые. Обмороки от чувствительности к схваткам, с головокружением, помутнением зрения, ослаблением слуха и тошнотой; необходим свежий воздух и свежая вода. Ложные схватки – боли в нижней части живота, сопровождающиеся *частым выделением больших количеств светлой мочи*. Схватки двигают ребенка вверх. *Разрывающие боли, начинающиеся в спине* и распространяющиеся вниз по внутренней стороне ног. Выделяется большое количество бесцветной мочи при схватках. Говорит, что должна встать. Одна щека красная, другая бледная. Ригидность внутреннего зева матки. Сильнейшее нервное возбуждение; роды чрезвычайно болезненны; пациентка стонет, причитает, просит о помощи. Тянущие боли, рас-

пространяющиеся от крестцовой области вперед, ощущение сжатия и пощипывания в матке, за которым следует выделение крупных сгустков крови (предлежание плаценты?). На первом этапе сварлива, не разрешает себя осматривать; отсылает врача и скоро зовет его обратно. Весьма невысокого мнения о своем собеседнике и говорит ему это напрямую. Не удовлетворена ничем, что для нее делается.

Выкидыш. Угроза выкидыша от гнева. Выводящие из себя боли. Спорит, сварлива, раздражительна, иррациональна. Боли сопровождаются выделением темной крови со сгустками, *при частом обильном мочеиспускании*; отхождение бесцветной мочи при каждой схватке; колики в области матки. Выделения темные или черные; зловонные; со сгустками; ярко-красные выбросы крови; обильные. Сдавливающая, направленная вовне боль, от спины вперед, ухудшение при лежании в постели. *В области матки похожие на схватки боли*, чередующиеся с кровотечением; распространяются в подреберную область; в бедра; периодические. Боль, беспокойство и мучения, связанные с областью матки. Нервное возбуждение. Тяжесть внизу живота. Зевота, озноб и дрожь.

Кровотечение. Темная свернувшаяся кровь, иногда перемежающаяся с ярко-красными выбросами, сопровождается разрывающей болью в ногах и сильными болезненными схватками в матке. Темная кровь, с давлением на матку и частыми выделениями бесцветной мочи. Приступы кровотечения, начинающиеся через нерегулярные промежутки вре-

мени. *От гнева.* Частое давление на матку, подобное схваткам. Ощущение, как будто крестец отделяется от тела. Через брюшную стенку прощупывается матка, как будто бы стянутая в небольшие узлы размером примерно с грецкий орех. Выделения темные; обильные; темные сгустки или свернувшаяся кровь; черные; зловонные; гнилостные; комковатые; прерывающиеся; конвульсивные; с частым выделением бесцветной крови. Во время или после родов.

Задержка отделения плаценты. Матка в форме песочных часов с общими указаниями на препарат. См. «Роды».

Судороги. Мощные. *От порывов гнева.* Повышенная чувствительность ригидного внутреннего зева. Схватки спазматические и подавляющие, выкручивающие конечности. Раздражительность и капризность; ехидное возбуждение. Одна щека красная, другая бледная. Вздрагивает и мечется во сне. Конвульсии в спине, с отбрасыванием головы назад, при жестком теле, как при столбняке или заболеваниях столбнячной природы.

Послеродовые схватки. Сильные и подавляющие, делающие пациентку безумной и злобной. Послеродовые выделения обильные, темные, в сгустках. Желает свежего воздуха. Чувствует, что не может вынести боли; хочет уйти от себя. Жажда. Один из лучших препаратов, когда к нему есть показания.

Общее. *Злобная, неожиданная или невежливая раздражительность.* Чувствует, что «не может быть вежливой»,

«не может дать вежливый ответ», придирчива, резка или кратка в своей речи. Страдает приступами гнева. Спокойствие служит противопоказанием этому препарату. Весьма раздражительна. Сильная боль делает ее сварливой; слишком тяжело, чтобы это вынести. Боли внизу живота с частым выделением бледной, бесцветной мочи в больших количествах. Желание лечь; двигаться. Зевота и потягивание. Жажда. Озноб вместе с жаждой. Очень красные щеки; одна щека красная, другая бледная. Ощущение возбуждения в теле (беспокойство). Не может выносить, когда с ней говорят или когда прерывают ее речь. Большое беспокойство, все кажется происходящим слишком медленно. Брюзглива, ничего ее не устраивает. Обижается при малейшем беспокойстве или противоречии. Чувствительна к любым запахам. Дыхание затруднено, как будто грудь недостаточно широка. Учащенное сердцебиение и обмороки. Тянущая боль в спине; в пояснице чувствуется как бы боль от ушиба. Ощущение, как будто поясничная область ломается, с тянущей и ноющей болью, распространяющейся от области печени, по низу живота и глубоко в область таза, когда пациентка лежит на кровати. Плохие результаты применения *Morphinum* или *Opium*.

China officinalis

Роды:

Схватки прекращаются от кровотечения, затяжного поноса и т. п. Низкий тонус матки. Пациентка не терпит прикосновений (даже к руке) во время схватки. Долбящая, разрывающая боль в матке. Обмороки и конвульсии от потери крови и прочих жизненных соков. Желает, чтобы ее слегка обмахивали. Желает свежего воздуха. *Звон в ушах, холодная кожа, потеря пульса* (или почти потеря), *и холодный пот*. Головокружения. Истощение от потери жидкостей. Нетерпимость к осмотру от нервозности.

Выкидыш. Ощущение растяжения или вздутия нижней части живота, как будто брюшная полость чем-то плотно набита. Пациентка стремится избавиться от газов, но их перемещение вверх или вниз не приносит облегчения. Кровотечение с осложнениями. Плодные оболочки остаются неделями, от чего происходит постоянное кровотечение. Обильное кровотечение ярко-красного цвета, сопровождающееся тревожным упадком сил. Возможна *потеря сознания, потеря пульса, прекращение дыхания, вялость и мертвенная бледность*. *Кровотечение подавляет*. От анемии; прилива крови к матке; маточной инерции. Выделения черные и комковатые; темные; ярко-красными выбросами; прерывистые; пасивные; обильные; водянистые с комками.

Кровотечение. От атонии матки. От злоупотребления Chamomilla. Пароксизмальные извержения крови в темных сгустках. Спазмы, колики матки. Частые позывы к мочеиспусканию, болезненное напряжение внизу живота. Холодная голубоватая кожа. Подходит людям, потерявшим много крови, даже в тяжелых случаях, что сопровождается тяжестью в голове; звон в ушах; головокружения; утрата чувств; ступор; припадки обморока; холодные конечности; глотает ртом воздух; лицо и руки бледные и голубоватые; конвульсивные толчки вдоль низа живота; выкручивание и сокращение отдельных мускулов. Перемежается с маточными судорогами, коликами и болезненным вздутием нижней части живота. С закрытыми глазами пациентка видит образы людей и предметов, исчезающие, когда глаза открываются. Хочет, чтобы ее легко обмахивали. Обмороки. Выделения черные; темные сгустки; сгустки, смешанные с бледной водянистой кровью; очень обильные; пассивные.

Задержка отделения плаценты. Подобно кровотечению, см. выше.

Судороги. *От сильной потери крови.* Прилив крови к голове, пульсация сонной артерии. Выкручивание конечностей.

Ребенок. Обморок после сильной кровопотери у матери во время родов.

Общее. Темная кожа. Ослабление организма от потери жидкостей, большой или небольшой. Чувствительность всей

нервной системы; малейший шум или возбуждение непереносимы. Звон в ушах. Лицо бледное; красное; красные пятна на щеках; голубизна вокруг глаз; землистый цвет лица; пустые глаза. Голод без аппетита. Зябкость с дрожью. Сильная жажда. Боль, как от ушиба в различных частях тела. Ощущение толчков, судорог, разрывающей боли. Приток крови к отдельным частям тела. Обмороки от потери жизненных соков. Телесная расслабленность; стремиться присесть или отдохнуть. Стремление к движению. Нервное истощение; общее истощение. Дрожь в отдельных частях тела. Медленное течение мыслей. Бред от опустошенности. Склонна упрекать и злить других. Думает, что она очень несчастна и все время окружена врагами. Подавлена, угрюма, никакого желания жить. Безутешная тоска, даже до самоубийства. Селезенка увеличена. Учащенное сердцебиение с приливом крови к лицу. Лицо жаркое при холодном теле. Отдельные части тела ощущаются дряблыми, немеют. Нетерпимость к чувственным проявлениям. Сильная пульсирующая головная боль. *Легкое прикосновение* усиливает боль, которая облегчается при *сильном, постепенном давлении*. Порывистые звуки при дыхании. Может различить лишь контуры удаленных объектов. Во время чтения буквы кажутся бледными и окруженными белой рамкой. Видит лучше после сна. Ощущение растяжения внизу живота.

Chinum sulforum

Роды:

Схватки напоминают тонические судороги, сопровождающиеся конвульсивными подергиваниями. Бессознательное состояние после разрешения от бремени. Подавленное дыхание. Раздутые вены на голове и шее; учащенный и прерывистый пульс; белок в моче. Во время промежутков между схватками – конвульсивные подергивания мускулов на лице, глазах и т. п.

Кровотечение. Пассивная метроррагия, при пониженной чувствительности. Сильное истощение от существенной потери крови.

Судороги. Тетанические судороги, сопровождаемые потерей сознания; во время промежутков между схватками – конвульсивные подергивания мускулов на лице, глазах и т. п. Подавленное дыхание. Раздутые вены на голове и шее; слабый, учащенный и прерывистый пульс; белок в моче. Потеря сознания после родов. Альбуминурические спазмы. Подергивания или клонические спазмы в членах.

Общее. Оживление, возбужденное состояние; позже подавленность. Ощущение надвигающегося зла; тревожность. В голове как будто кружится мельничное колесо. Сильная пульсирующая головная боль. Закрывает глаза против собственного желания от полной прострации. Может видеть

объекты лишь краем глаза. Звон, рев, жужжание в ушах. Лицо бледное; болит; болезненного вида; отекшее. Беспокойство; повышенная чувствительность к прикосновениям и шуму. Слабость. Дрожь. Нервность. Обмороки. Голод. Истощение, вызванное значительной потерей жидкостей. Селезенка увеличена; в ней – тупая боль, появляющаяся при нажатии. Увеличенная и наполненная кровью печень.

Chloroformum

Роды:

Невозможно освободиться от болей между схватками.

Много жалуется на спину или на очень сильную боль и болезненную чувствительность всей нижней части живота. Весьма беспокойна. Не может обрести покоя ни в каком положении, крутится туда-сюда и весьма беспокойна. Продолжительные и тяжелые роды из-за ригидности внутреннего зева матки. Женщины склонны к конвульсиям во время родов. Полный паралич мочеиспускательного сфинктера после родов.

Судороги. Женщины склонны к конвульсиям во время родов. От анемии; уремии; рефлекторной раздражительности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.